



探訪 Welcome to Kinmen 飛鳥的快樂天堂 金門

在金門，擁有全國鳥類最高棲息密度紀錄將近三百種常見、罕見的珍貴鳥種，不約而同選擇在各個季節或棲息、或短暫過境，這是一塊美麗潔淨無污染的天宇，是飛鳥們鍾愛的飛翔天堂。

歡迎您帶著賞鳥裝備和一顆愉悅的心情來金門 探訪風中天使，與飛鳥共舞

1 區 慈湖區 沙商農場 常見鳥類

常見留鳥：紅鳩、環頸雉、常見冬候鳥：冠鵲、鷓鴣、羅紋鴨、長腳鵠、金背鳩、小黃嘴雀、地啄木、常見過境鳥：小燕燕、東方澤鶉

本區位於金門本島北邊，主要鳥類為冠鵲、慈湖東岸及東側兩處繁殖地、南山林道、沙商農場、生態環境類型為沿海潮間帶、湖沼、魚塢養殖池等，是鹹淡水交接的濕地生態景觀，以及開闢地農耕地、疏林及田野環境。

紅鳩
Red Pouter
常見留鳥 體長23cm

分布於中國東部、南部、中南半島、菲律賓、爪哇及印度。金門地區數量極少不見，但近年來在沙商農場常見，且數量有越來越多的趨勢。常見牠們在地面上覓食，以穀類及草籽為食，糞便的酒精是牠們主要的食物來源。

小黃嘴雀
Black-tailed Noddy
常見留鳥 體長18cm

繁殖地在中國東部及南部，多季遷移到日本南部及中國東南部。常見牠們在稀樹疏林、竹林、南山林道等地覓食。主要食物為昆蟲、果實、植物嫩芽等。飛行速度很快且靈活，拍翅聲清脆。平時叫聲響亮的「啾啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黃眉柳鶯
Pallas's Warbler
常見留鳥 體長11cm

繁殖地在西伯利亞，多季遷移到中南半島及中國東南部。常見牠們在稀樹疏林、竹林、南山林道等地覓食。主要食物為昆蟲、果實、植物嫩芽等。飛行速度很快且靈活，拍翅聲清脆。平時叫聲響亮的「啾啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

白頸紫喉
Blue Whistling Thrush
常見留鳥 體長32cm

分布於中國、中南半島、蘇門答臘、尼泊爾及中亞。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

白頸紫喉
Blue Whistling Thrush
常見留鳥 體長32cm

分布於中國、中南半島、蘇門答臘、尼泊爾及中亞。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

松雀鷹
Acceptor virgatus
常見留鳥 體長39cm

分布於東亞及東南亞。本鳥種在金門棲息狀況不明，太武山周圍的樹林比較有機會發現。喜歡在樹林活動，常見牠們在空中盤旋。身體有良好的保護色，站立在樹幹上不易被發現，以小昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為連續的「啾啾啾」聲。

白頸紫喉
Blue Whistling Thrush
常見留鳥 體長32cm

分布於中國、中南半島、蘇門答臘、尼泊爾及中亞。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

黃眉柳鶯
Pallas's Warbler
常見留鳥 體長11cm

繁殖地在西伯利亞，多季遷移到中南半島及中國東南部。常見牠們在稀樹疏林、竹林、南山林道等地覓食。主要食物為昆蟲、果實、植物嫩芽等。飛行速度很快且靈活，拍翅聲清脆。平時叫聲響亮的「啾啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

環頸雉
Common Pheasant
常見留鳥 體長80cm

金門原本沒有原生的環頸雉，據說是居民自台灣帶到金門飼養，不慎逃到野外而自然繁衍。這種現象被稱為「環頸雉島」。環頸雉常使用嘴爪掘土尋找食物，以植物的種子、嫩芽、果實、昆蟲等為食，常被雞或地鼠掘出，造成農民損失。遇危險時會以半蹲姿勢警戒，緊急時會發出尖銳的「啾」聲。

大鵝
Great Cormorant
常見留鳥 體長120cm

分布於亞洲、歐洲及北美洲。亞洲族群會遷移至中國南部、中南半島一帶。屬於群居性鳥類，金門地區近年來數量增加約有千隻至一萬隻。大部分棲息於慈湖、沙商農場、太武山及小金門的淡水湖及西湖等水域。慈湖夜棲雁群白天會成群到海上覓食，以集體捕魚的覓食策略為主，海面非常驚濤拍岸。而慈湖沙商農場、沙商農場的魚塢或小型的淡水池活動，白天棲息於樹林。十月後，慈湖邊的沙商農場林道常發現所排出的白色糞便，彷彿置身景色。

金背鳩
Oriental Turtle Dove
常見留鳥 體長30cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

小黃嘴雀
Black-tailed Noddy
常見留鳥 體長18cm

繁殖地在中國東部及南部，多季遷移到日本南部及中國東南部。常見牠們在稀樹疏林、竹林、南山林道等地覓食。主要食物為昆蟲、果實、植物嫩芽等。飛行速度很快且靈活，拍翅聲清脆。平時叫聲響亮的「啾啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

環頸雉
Common Pheasant
常見留鳥 體長80cm

金門原本沒有原生的環頸雉，據說是居民自台灣帶到金門飼養，不慎逃到野外而自然繁衍。這種現象被稱為「環頸雉島」。環頸雉常使用嘴爪掘土尋找食物，以植物的種子、嫩芽、果實、昆蟲等為食，常被雞或地鼠掘出，造成農民損失。遇危險時會以半蹲姿勢警戒，緊急時會發出尖銳的「啾」聲。

冠鵲
Great Crested Grebe
常見留鳥 體長56cm

分布於歐洲、亞洲、非洲及澳洲。主要生活在海上，湖泊及水庫等寬闊水域。金門西岸沿海常見牠們的蹤跡。是最佳觀賞的觀鳥地點。常隨着水邊活動，腳有蹼，善於游泳。可潛水數分鐘之久。遇危險時常不飛走而潛水逃避。魚類為其食。

大鵝
Great Cormorant
常見留鳥 體長120cm

分布於亞洲、歐洲及北美洲。亞洲族群會遷移至中國南部、中南半島一帶。屬於群居性鳥類，金門地區近年來數量增加約有千隻至一萬隻。大部分棲息於慈湖、沙商農場、太武山及小金門的淡水湖及西湖等水域。慈湖夜棲雁群白天會成群到海上覓食，以集體捕魚的覓食策略為主，海面非常驚濤拍岸。而慈湖沙商農場、沙商農場的魚塢或小型的淡水池活動，白天棲息於樹林。十月後，慈湖邊的沙商農場林道常發現所排出的白色糞便，彷彿置身景色。

羅紋鴨
Falcated Teal
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在西伯利亞、蒙古及中國東北，多季遷移到日本、中國東部及中國南部。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

長腳鵠
Black-winged Stilt
常見留鳥 體長32cm

長腳鵠有一雙特長的腳，其腿部的骨節高度，高結的骨節能縮短其腿部的長度，使其能在較深的水域覓食。慈湖東岸及西湖的魚塢、浦邊常見牠們進水覓食。叫聲為尖銳響亮的「啾」聲。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

藍石鵲
Blue Rock Thrush
常見留鳥 體長23cm

繁殖地在日本、韓國、中國東部、中國南方、南洋群島、中亞及歐洲南部地區。冬季較北方的族群會南遷到中南半島、印度及非洲。多喜棲息在突出岩石或建築物上，如屋頂角落的地方，所以被稱為「角石鵲」。常在海岸邊的聚落覓食。飛行時發出輕微而尖細的單音「啾」聲，或類似用力咀嚼乾果的聲音。

黑鵲
Black Crow
常見留鳥 體長48cm

繁殖地在中國東部、中國南方、中南半島、印度及非洲。金門地區數量極少，可能為多被鳥或留鳥。曾多次在太武山的本庫或東部海岸發現，於4月繁殖季節多同時看到一隻。喜歡在樹木或水邊活動，常在樹木上覓食，以昆蟲、蜘蛛、兩棲類等為食。叫聲為長而尖銳響亮的「啾」聲。

